

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV

2020

Az állategészségügyi technológia és a járványvédelmi terv célja a betelepítésre került állatállomány termelési színvonalának javítása mellett az esetlegesen fellépő megbetegedések kártételének csökkentése, valamint megbetegedések fellépése esetén annak helyhez kötése, felszámolása, továbbterjedésének megakadályozása.

A betegségek, így a szalmonellafertőzések leküzdésének leghatékonyabb módja a „megelőzés”, melynek fontos része a megfelelő higiéniai környezet kialakítása.

HAJDUVET ÁLLATGYÓGYSZER KERESKEDELMI KFT

4030 Debrecen, Lahner u. 1/A.

www.hajduvet.hu

hajduvet@hajduvet.hu

Gyógyszertár: (52) 411-100

Titkárság: (52) 437-348

Fax: (52) 530-581

Dr. Zsoldos István | Szakállatorvos
M: +36(30)925-9120



TARTALOMJEGYZÉK

Állattartó telepek létesítménye	3. oldal
Telepi kötelezettségek	3. oldal
Fertőtlenítés	5. oldal
Személy forgalom	13. oldal
Gépjármű forgalom	18. oldal
Anyag forgalom	21. oldal
Istállózárság	21. oldal
Járványvédelem	22. oldal
Rovar- és kártevő irtás	23. oldal
Takarmányozás	25. oldal
Egyéb állatok tartásának szabályai	26. oldal
Állatforgalom szabályai	26. oldal
Egyéb	27. oldal
Állategészségügyi szabályok	27. oldal
Állati eredetű melléktermékek kezelése	28. oldal
Állatgyógyászati készítmények alkalmazásának szabályai	29. oldal
Az állattartó telepen szükséges dokumentációk	30. oldal
Felelősök, állatorvosi aláírás	31. oldal

1. Állattartó telep létesítménye

1.1. Nagy létszámú állattartó telep kerítéssel bekerítve, gépjárművek számára zárható kapuval, zárható személyi bejáróval.

1.2. Állattartó épület darab egyenként m² alapterülettel. Épületenként (számítógéppel vagy kézzel) vezérelt technológiájú etető- és itató sorokkal, hűtéssel, kürtös és alagút szellőzéssel, légbeejtőkkel, ködös vagy paplanos hűtéssel. Épületek előterében kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőség, csizmafertőtlenítő láda, szeméttároló, gyógyszeradagoló, számítógépes vezérlés, elektromos kapcsoló- szekrény van elhelyezve.

1.3. Egyéb építmények:

- Fekete-fehér rendszerű öltöző
- Fertőtlenítőszer tároló, ivóvíz kezelő gépház
- Hullakamra, boncoló
- Alomanyag tároló fészker
- Gépjármű kerékfertőtlenítő medence
- Anyagtároló épületek
- Hulladéktároló

2. Telepi kötelezettségek

2.1. Nagy létszámú állattartó telepet, épületet benépesíteni csak a járási hivatal előzetes engedélyével, az országos mentesítés körébe vont betegségek kórokozójától mentes állományból származó, azonos fajú – lehetőleg egy helyről származó és azonos korú - állatokkal szabad, a

származási helyen vagy az elkülönítőben elvégzett, előírt diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján.

Az állattartó telepen más fajú állat csak az illetékes hatósági állatorvos engedélyével tartható. Az újonnan benépesített telep egyben elkülönítőnek minősül.

Benépesített állattartó telepre, állományba, idegen helyről vagy külföldről származó állatot bevinni csak kedvező eredménnyel zárult elkülönítés után, a járási hivatal előzetes engedélyével szabad. Az előírt vizsgálatokat az elkülönítés ideje alatt kell elvégezni.

2.2. Állattartó létesítményt, úgy kell kialakítani és üzemeltetni, hogy annak benépesítése és kiürítése (az állatok elszállítása) egyszerre, hét-tizennégy napon belül elvégezhető legyen.

2.3. A nevelési tevékenység megkezdéséről a telepvezető (termelési igazgató) értesíti az ellátó állatorvost és az önkormányzat jegyzőjét.

2.4. Folyamatos számítógépes vagy kézi nyilvántartást vezet, a tartott állatok

fajtájáról, koráról, létszámáról, a betelepítés időpontjáról, az állomány származási helyéről, napi elhullás adatairól, gyógykezelésekről, a vakcinázások időpontjáról.

A tervezett telepítési létszám db (.....db/m²).

Tervezett elhullás ...%. Tervezett kivágás db ... napos korban.

Telepen foglalkoztatott dolgozók száma: 1 telepvezető, (1 telepvezető helyettes), dolgozó.

2.5. Gondoskodik a folyamatos állatorvosi ellátásról.

2.6. A vásárolt állomány származási igazolásait, hatósági állatorvosi

igazolásokat megőrzi, iktatja.

2.7. A keletkező állati hulladékot állatorvosi vizsgálat után nyilvántartásba veszi, a 16. pont szerint gyűjti és ártalmatlanítja.

2.8. A telepen keletkező trágyát az 3.2.5. szerint kezeli és nyilvántartás mellett eltávolítja.

2.9. Betegsége gyanús, vagy fertőzöttségre gyanús állatok észlelése esetén a telepvezető haladéktalanul értesíti az ellátó állatorvost.

3. Fertőtlenítés

3.1. A fertőtlenítés általános szabályai

3.1.1. A fertőtlenítés célja

A) A fertőző állatbetegségek megelőzése és az állatok csíraszegény környezetének kialakítása céljából fertőtleníteni kell.

A preventív fertőtlenítés: időszakonként (a termelési folyamat végén, új állomány betelepítése előtt).

B) A fertőző állatbetegség leküzdése céljából fertőtleníteni szükséges:

a) betegség időtartama alatt: folyamatos, ismételt, előzetes fertőtlenítés.

b) a zárlat feloldása előtt vagy más betegségleküzdő intézkedés befejezésekor (végfertőtlenítés).

3.1.2. A betegségek megelőzése és leküzdése során a fertőtlenítés módja lehet

- egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),

- szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása).

3.1.3. A fertőtlenítőszer, tárolásuk és használatuk

Fertőtlenítőszer

Lúgok:

Foszfortartalmú fertőtlenítőszer

Klórtartalmú fertőtlenítőszer:

- Hipokloritok
- Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban
- Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban

Klórtartalmú fertőtlenítőszeret 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű alkalmazni.

Klórtartalmú fertőtlenítőszeret melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag vagy épzománcú fémedényben kell tartani.

Felhasználás előtt hatékonyság szempontjából meg kell vizsgálni a kémhatását (ph) és az aktív klórtartalmát. Robbanás veszélye miatt a raktározás és felhasználás közben ügyelni kell arra, hogy klórtartalmú fertőtlenítőt formalinos tárolóedénybe - és fordítva ne öntsenek. Célszerű a tárolóedényeket tartósan megjelölni.

Aldehidek:

- Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt.
- Jodoformok: 1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0

Egyéb: A közegészségügyi hatóság által engedélyezett készítmények.

3.1.4. A fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítő oldat- mennyiségét,- a kijuttatás nyomását,- szemcsenagyságot a fertőtlenítendő felület

minősége és nagysága, a megelőző takarítás színvonala határozza meg.

Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés használata esetén az egy m² fertőtlenítéséhez szükséges oldat mennyisége:- fólia 0,1 liter,- sima beton, csempével, olajfestéssel bevont felület 0,2 liter,- gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter, téglafelület 1 liter,- döngölt agyagfelület 1,5 liter,- laza, homok felület 3,0 liter.

Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell alkalmazni.

3.1.5. A fertőtlenítés megkezdésekor a fertőtlenítést irányító felügyelőnek ügyelni kell arra, hogy:

- a fertőtlenítést végző személy egészségügyi alkalmasságát tanúsító okmánnyal rendelkezzen,
- a fertőtlenítést végző dolgozó munkavédelmi oktatásban részesült-e,
- a megfelelő munkavédelmi eszközök és öltözék rendelkezésre állnak-e,
Ezek: gumicsizma, vizet át nem eresztő overál, gumikesztyű, védősisak, gázálarc, védőszemüveg
- amennyiben az épületben állatok vannak, olyan fertőtlenítőszerrel kell alkalmazni, amely az állatok egészségét nem károsítja,
- Munka közben étkezni, dohányozni tilos!
- a dolgozóknak az erősen savas vagy lúgos oldatok kezelése, keverése idején lehetőséget kell teremteni arra, hogy a bőrfelületre került anyagot azonnal lemossák (konyhasó oldat: 9 g 1 liter desztillált vízben, bórsavoldat: 10 g 1 liter desztillált vízben)
- a fertőtlenítéshez olyan nyomást és szemcsenagyságot kell alkalmazni, hogy a tevékenység az építményben felesleges károsodást ne okozzon

- fertőtlenítéskor be kell tartani a közegészségügyi, környezetvédelmi, munka- és balesetvédelmi előírásokat, valamint tekintettel kell lenni arra, hogy a fertőtlenítés az állatok egészségét ne károsítsa
- a fertőtlenítő oldat elkészítését, a fertőtlenítés és a készletek ellenőrzését minden esetben a telepvezető végzi, nyilvántartást vezet a fertőtlenítőszer felhasználásáról

Mindenkori fertőtlenítőszer készlet

Az egyszeri telepi fertőtlenítéshez szükséges szerek mennyiségéről mindenkori készletről kell rendelkezni.

A.) Felületfertőtlenítő: : **PERFECT KOMBICID 20 kg** ... db (... kg)

B.) Felület lúgos tisztító, fertőtlenítő habosító: **PERFECT BASE 20 kg**
... db (... kg)

C.) Itatórendszer tisztító, fertőtlenítő **ANTI-GERM DES OXI-150 24 kg**
1 db

3.2. A fertőtlenítés végrehajtása

3.2.1. Szociális helyiségek fertőtlenítése kizárólag az erre a célra a közegészségügyi hatóság által engedélyezett készítményekkel, az előírt módon végezhető **PERFECT KOMBICID 1%-os** oldatával.

3.2.2. Az állattartási épületek és környezetük fertőtlenítése

a) egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:

- az épület áramtalanítása,
- trágya kihordása, eltávolítása,
- mennyezet, szellőzők, kürtők, oldalfalak, padozat száraz fizikai takarítása,
- Az istálló felületeinek habosítása, **PERFECT BASE lúgos habtisztító 2-3%** oldatával. A behatási idő alatt (20-30) perc a hatóanyagok feloldják a felületre száradt szennyeződések.

A hab a függőleges felületeken megtapad, így biztosítva a hosszabb behatási időt. (A falakat és a plafont is habosítani kell, alulról felfelé haladva „felépíteni” habot.)

- épület nagynyomású vízszugárral való mosása,
- az épület száradása,
- a kihordott technológiai berendezések mosása, fertőtlenítése majd visszahordása a kimosott épületbe,
- az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízszugárral való lemosása,
- száradás, javítási munkák, szerelés,
- az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá a visszahordott berendezések magasnyomású fertőtlenítő berendezéssel való fertőtlenítése, **VIREX 1%-os**, vagy **PERFECT KOMBICID 1%-os** oldatával. A szerek kijuttathatók habosítással és permetezéssel is.
Nem kell leöblíteni, hagyni kell a felületekre rászáradni.
- száradás után az épület nyílászáróinak zárása,- az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése.
- almozás
- Meleg vagy hideg ködös fertőtlenítés, **GERMICIDAN FF PLUSZ (1 liter/1000m3)** vagy **PERFECT KOMBICID (2,6 liter/1000m3)** vegyszer szükséges ködképző berendezéssel az épületbe juttatni. Behatás idő minimum 6 óra, telepítés előtt 2 nappal.
- fertőtlenítés eredményességének vizsgálata a 3.3. pont alapján,

b) A szigorított fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje:

- az épület áramtalanítása,
- a trágyát ki kell hordani, a telep területén szarvasba kell rakni, le kell fertőtleníteni, földdel le kell takarni,
- gépi és kézi eszközökkel az épület fizikai takarítását el kell végezni

- Az istálló felületeinek habosítása, **PERFECT BASE lúgos habtisztító 2-3%-os** oldatával. A behatási idő alatt (20-30) perc a hatóanyagok feloldják a felületre száradt szennyeződések. A hab a függőleges felületeken megtapad, így biztosítva a hosszabb behatási időt. (A falakat és a plafont is habosítani kell, alulról felfelé haladva „felépíteni” habot.)
- lúgos habosító, fertőtlenítő oldattal a technológiai berendezéseket is le kell habosítani,
- az épület belső mosását magasnyomású vízsugárral kell elvégezni,
- száradás javítási munkák elvégzése, a technológiai berendezéseket ki kell hordani,
- az épületen kívül megtisztított, **VIREX 1,5%-os** vagy **PERFECT KOMBICID 1,5 %-os** oldatával fertőtlenített berendezések visszahordása,
- Az épület belső terének fertőtlenítése a betegségre meghatározott nemű és koncentrációjú magasnyomású (10-20 bár) berendezéssel kijuttatott fertőtlenítőszerrel, **VIREX 1,5%-os**, **PERFECT KOMBICID 1,5%-os** oldatával. A szerek kijuttathatók habosítással és permetezéssel is. Nem kell leöblíteni, hagyni kell a felületekre rászáradni.
- száradás után az épületek zárása,
- Az épület külső felületének, környezetének, utaknak a fertőtlenítése, **VIREX 1%-os**, vagy **PERFECT KOMBICID 1%-os** oldatával permetezéssel.
- almozás
- Meleg vagy hideg ködös fertőtlenítés, **GERMICIDAN FF PLUSZ (1 liter/1000m³)** vagy **PERFECT KOMBICID (2,6 liter/1000m³)** termékekkel számolva ködképző berendezéssel az épületbe juttatni. Behatás idő minimum 6 óra, telepítés előtt 2 nappal.
- fertőtlenítés eredményességének vizsgálata a 3.3. pont alapján,

3.2.3. Itatórendszer tisztítása, fertőtlenítése

- Az ivóvízrendszert fel kell tölteni az **ANTI-GERM CLEAN CL39K 2%-os** oldatával, majd így lezárva tartani 4-6 órán keresztül. Ez feloldja a csövek belső felületét bevonó nyálkás lerakódásokat és elpusztítja a benne található algákat és gombákat.
- Az ivóvíz rendszert ezután az **ANTI-GERM TOP ACID 2%-os** oldatával fel kell tölteni, majd lezárva tartani 4-6 órán keresztül. Leoldja a csövek belsejében lerakódott bio filmek szerves részzeit, lerakódott vízkövet.
- Az ivóvízrendszert végül fel kell tölteni **ANTI-GERM DES OXI-150 0,5%-os** oldatával, majd lezárva tartani 1-2 órán keresztül. Fertőtlenítő hatása révén elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat.
- Mindegyik fertőtlenítőszeres víz leeresztését követően az itatórendszert alaposan ki kell öblíteni tiszta vízzel.

3.2.4. A kút, ivóvíz fertőtlenítése

A fúrt kút 40 méternél mélyebb, ezért évente a Vízügyi Hatóság értesítése és előírásai alapján történik a kút fertőtlenítése.

A telep víztisztító, vízfertőtlenítő berendezésének felügyelete naponta a telepvezető feladata, meghibásodás esetén azonnal intézkedik, telepi naplóba bejegyzi.

Évente egy alkalommal szükséges az ivóvíz laboratóriumi vizsgálata, a rendeletben előírt paraméterekre. A vizsgálati eredményeket állatorvos bírálja el. Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolja, állatorvosi felügyelettel soron kívül el kell végezni a megfelelő fertőtlenítési, tisztítási műveleteket.

Ismételt vizsgálattal meg kell győződni az eredményességről.

3.2.5. A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése

A) Az állattartó telepen a trágyalé aknába folyik. Azok tartalmát két telepítés között az épületek mosása és fertőtlenítése után szippantással ki kell üríteni.

B) A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival történt fertőzöttség esetén a trágyaléaknák tartalmát a fertőtlenítő oldat létesítésével kell fertőtleníteni.

1m³ szennyvízhez 100 ml klór lúgot kell számítani és azt 0,3 liter vízben feloldva kell az aknába önteni. A trágyaléaknák fertőtlenített tartalmát tartálykocsival el kell szállítani.

3.2.6. Az almos trágya és a hígtrágya szilárd fázisának fertőtlenítése

Nagy mennyiségű tömött almos trágyát el kell szállítani, a szállítási útvonalat fertőtleníteni kell **PERFECT KOMBICID 1%-os** oldatának permetezésével.

3.2.7. Járművek fertőtlenítése

Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, továbbá ezek felszerelését az előírások szerint tisztítani és fertőtleníteni kell: Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az ajtókat, vasalásokat, a kocsi futóművét és alvázat is meg kell tisztítani és fertőtleníteni.

3.3. A fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzése

Hatékony takarítás nélkül nincs hatékony fertőtlenítés, ezért amíg takarítási hibákat lehet találni a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzése értelmetlen.

Vattatamponos módszer: a vizsgáló laboratórium által biztosított steril mintavevő tamponokkal kell elvégezni a mintavételezést. A kijelölt mintavételi helyekről (padozat, falak, etető, szellőzőrendszer) az állatorvos által meghatározott számú mintavétel történik, melyekből baktérium tenyésztését, meghatározását a laboratórium elvégzi. Az elvégzett környezet higiéniai vizsgálat eredményét az állatorvosnak értékelni kell, az észlelt hiányosságot azonnal ki kell javítani.

A fertőtlenítést akkor nevezzük hatásosnak, ha a vizsgált felületeken az összes csíraszám nem haladja meg a 100/100cm² értéket, ezen belül a coliform, a staphilococcus vagy gombaszám a 10/100cm² határt.

Amennyiben az összes csíraszám a fent említettél magasabb, vagy kórokozó baktériumot (pl. szalmonellát) is kimutattak, a fertőtlenítés nem volt elég hatékony, szükséges az előbbinél hatékonyabb, ismételt fertőtlenítés elvégzése a telepítés előtt.

4. Személyforgalom

4.1.1. A nagy létszámú állattartó telepre az ott dolgozókon és az időszakos munkavégzés céljából belépőkön (állattenyésztő szervezet és hatóság ellenőre) kívül csak a telep tulajdonosa, üzemeltetője, a telepet ellátó-és a hatósági állatorvos, a megelőző járványvédelmi előírások betartása mellett léphet be.

Látogató csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy védőköpeny, sapka és védőlábbeli felvétele után, a telepet ellátó állatorvos felügyelete mellett léphet a telep területére. A látogató nevét, címét és a látogatás idejét a telepi naplóban rögzíteni kell.

Járványveszély esetén az állattartó telepek nem látogathatók.

4.1.2. A szociális épület, az istállók és a kerítés összes ajtaját állandóan zárva kell tartani. A telepre belépni csak a szociális épület bejárati ajtaján szabad. A bejáratoknál belépő lábbeli fertőtlenítő tálcat és kézfertőtlenítés céljára lavórt kell elhelyezni. A kézfertőtlenítők mellé kéztörölőpapírt kell kihelyezni. A megtörölt kézre **ZAZU** kézfertőtlenítő gélt kell nyomni és a kézfelületen eldörzsölni. A kéz és lábbeli fertőtlenítés minden belépő számára kötelező. A telepvezető feladata, hogy a kéz és a lábbeli fertőtlenítőben, minden reggel munkakezdésre kicseréljék a fertőtlenítőszeres oldatot. A telepvezető köteles ellenőrizni, hogy a dolgozók használják-e a kézfertőtlenítőt és a lábbeli fertőtlenítőt.

A kéz és lábbeli fertőtlenítőkből (tálca vagy szőnyeg) **VIREX 1%-os** oldatát kell használni. a **VIREX** narancssárga folyadék színváltozással jelzi a hatékonyság csökkenését.

4.2. Az öltöző használata: Az öltöző fekete-fehér használatához a telepvezető köteles biztosítani az összes feltételt: elegendő melegvíz, munkaruha, csizma, törölköző, szappan, sampon, papucs, hajszárító. Az öltözőt fekete - fehér elv szerint kell üzemeltetni. A szociális épület „fekete” öltözőjéből csak fürdés és hajmosás után szabad a „fehér” öltözőbe átmenni. Utcai ruhában tilos a „fehér” öltözőben és az étkezőben tartózkodni. A telepi munkaruhába (védőruha) való átöltözés kötelező minden személy részére

aki a telepre belép: baromfigondozók, telepvezető, állatorvos, hibaelhárítók, ellenőrző személyek, technikusok, látogatók, vendégek stb.

A telepen bármiféle saját ruházatot (beleértve alsóneműt, zoknit is) tilos viselni. Hibaelhárítók, ellenőrző személyek vagy bármely dolgozó érkezése esetén a bejárati ajtó kulcsát a kerítésen át kell kiadni, a „fekete” öltöző ajtaját a telepre érkező személy kívülről nyitja ki. A kulcsot a telepvezető vagy megbízottja adja ki a telepre érkező személyeknek. A telepi munkaruhában, normál telepi munkavégzés során, semmilyen körülmények között sem szabad a telep területét elhagyni.

Amennyiben a telep kapuján munkavégzés céljából ki kell lépnie a dolgozónak, előtte a munkaruha és gumicsizma cserét kell végrehajtania a szociális helyiségben. A külső munkavégzés után (a munkaruha szennyeződik, és fertőzés veszélyt hordoz), a telepre visszatérve befürdés és tiszta munkaruha felvétele után szabad.

4.3. Kézfertőtlenítés

4.3.1. Kézfertőtlenítő lavór szükséges szociális épület ki és belépésekor, minden ól előterében.

4.3.2. ZAZU kézfertőtlenítő géllal kell feltölteni az adagolókat. Az adagolókat ki kell helyezni, illetve kötelező alkalmazni a telepre történő belépéskor, szociális épület be- és kilépésekor, ólak előterében, állatszállítás előtt és után, szállítójárművek személyzetének.

4.4. A munkaruha használata és mosása: A telepi munkaruhát, papucsot, csizmát, cipőt a telepről kivinni szigorúan tilos, a mosást, tisztítást helyben kell megoldani. A dolgozók munkaruháját szükség szerint, de minimum hetente egyszer, az ellenőrzőszemélyek, állategészségügyi

technikusok, vendégek, szerelők védőruháját, a munkavégzést követően kell kimosatni fertőtlenítő hatású mosószerrel.

4.5. Nyilvántartás: látogatók, ellenőrző személyek, egyéb telepen munkát végző személyek, járművek.

Vendégek, látogatók csak a termelési vezető és az ellátó állatorvos engedélyével a fenti előírások betartásával mehetnek a telepre.

A telepre belépő személyekről és járművekről írásos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése a telepvezető feladata. Járványvédelmi okokból minden telepen köteles a telepvezető egy erre a célra rendszeresített nyomtatványon rögzíteni mindazon személyek nevét, akik a telep területére léptek. Kivétel képez a telepen állandó munkát végző telepvezető és a telepi dolgozók.

A nyilvántartásba vétel vonatkozik az ideiglenes dolgozókra, az ellenőrző személyekre, állatorvosokra, technikusokra, a szerelőkre stb.

A nyilvántartásban rögzíteni kell: a látogatók nevét, a látogatás célját és időpontját, és aznap vagy előző napokban mely baromfitelepen járt, a személy aláírását. Külön gépjármű nyilvántartásban fel kell jegyezni a telepre behajtó járművek rendszámát, a behajtás indokát (pl. takarmány, alom, állat szállítás), a telepre behajtó járművezető, illetve a járművel érkező személyek nevét. A nyilvántartásokat az állomány betelepítési napjától kezdve a kivágás befejezéséig kell vezetni, és azt a telepen az állatok elszállítását követően legalább 1 évig meg kell őrizni.

4.6. Az élelmiszerekre vonatkozó szabályok: Étkezni csak a munkarendben meghatározott időben, a szociális épület fehér övezetében levő étkező helyiségében szabad. Az étkezőbe vihető: A telep étkezőjébe a dolgozó magával viheti kézitáskájában higiéniai felszerelését, valamint a magával hozott ételt.

A telepre étkezés céljából nyers tojás, baromfi-hús és egyéb nem hő kezelt baromfitermék nem vihető be.

Az ételt nem szabad az istállóba kivinni. A telepvezető naponta köteles ellenőrizni minden élelmiszert és azok csomagoló anyagát, amelyet a dolgozók a szociális helyiség étkezőjébe bevisznek.

4.7. A szociális épület takarítása: A szociális épületeket minden nap legalább három alkalommal / reggel a dolgozók fürdése után, a reggeli után közvetlenül, és a nappali műszak után / ki kell takarítani.

A padlót minden helyiségben mosó-fertőtlenítőszeres vízzel fel kell mosni, egy időben a mellékhelyiségeket is fertőtleníteni kell **PERFECT KOMBICID 1,5%-os** oldatával. Naponta kétszer a fürdés után ki kell takarítani és fertőtleníteni **PERFECT KOMBICID 1,5%-os** oldatával a zuhanyfülkéket is.

4.8. A látogatókra vonatkozó szabályok : A telepre csak a termelési vezető és az állatorvos engedélyével léphetnek látogatási és munkavégzési céllal idegen személyek.

A telep látogatását szervező feladata a fenti szabályról előzetesen tájékoztatni a látogatókat. A látogatókat lehetőleg nem kell beengedni az állatok közé, az előtérből való betekintést kell biztosítani. A látogatóknál ugyanazokat a higiéniai és járványvédelmi szabályokat kell alkalmazni, mint a saját dolgozóknál. A telepre való belépéskor minden alkalommal kötelező a fürdés és a telepi munkaruha használata. A látogatóknak a telepvezető köteles biztosítani a fürdéshez szükséges dolgokat (törölköző, papucs, sampon), valamint a külön telepi munkaruhát és a gumicsizmát vagy lábzsákot.

4.9. A bedolgozókra vonatkozó szabályok: Tömegmunkák végeztetésekor (szállítás, vágás, vakcinázás) szükség lehet bedolgozókra. A

dolgozók toborzását a telepvezető végzi és ellenőrzi. A bedolgozók alkalmazása során ugyanazokat a higiéniai és járványvédelmi szabályokat kell alkalmazni, mint a saját dolgozóknál.

A telepre való belépéskor minden alkalommal kötelező a fürdés és a telepi munkaruha használata. A bedolgozóknak a telepvezető köteles biztosítani a fürdéshez szükséges dolgokat (törölköző, papucs, sampon), valamint a külön telepi munkaruhát és a gumicsizmát vagy lábzsákot.

4.10. Oktatás: A telepen munkát végző személyek tájékoztatását illetve oktatását félévente az adott telep vezetője, vagy külső előadó köteles elvégezni. Az oktatást jegyzőkönyvben, aláírással kell dokumentálni.

Főbb szempontok: Valamennyi dolgozónak tilos háztáji baromfiállományt tartani illetve ismerősénél baromfit megtekinteni, ott munkát végezni. Szomszédságban vagy bármi más baromfiállományban nagyobb arányú elhullást, vagy megbetegedést tapasztaltak, hallottak, jelentsék a telepvezetőnek, aki értesíti az állatorvost.

4.11. A telepen huzamosan dolgozó személyeknek (telepvezető, állatgondozók, takarítók stb.) évente szalmonella bélsárvizsgálatot kell végezniük!

5. Gépjárműforgalom

5.1. Telepi zártság: A telepek kapuját folyamatosan zárva kell tartani, kinyitni csak a behajtás illetve kihajtás idejére szabad. A telepre az engedélyezett járműveket csak a telepvezető által megbízott dolgozó vagy a telepvezető engedheti be.

5.2. A sofőrökre vonatkozó szabályok: A telepre beengedett járművek sofőrjeinek a telep kapujánál fóliacsizmát és egyszer használatos védő

overallt kell adni, amit fel kell vegyenek. A telepen csak fóliacsizmában közlekedhetnek.

A sofőrök a telepen való tartózkodás alatt lehetőleg maradjanak a gépjármű fülkéjében (pl. állatszállítás) vagy a járműből csak akkor szálljanak ki, ha az a munkavégzéshez feltétlenül szükséges (pl. takarmányszállítás). A sofőrök az istállók előterébe nem léphetnek be.

5.3. Kerékfertőtlenítő medence: Azokon a telepeken, ahol építettek, a telep területére csak a telep kapujában kialakított kerékfertőtlenítő medencén keresztül hajthatnak be a gépjárművek. A kerékfertőtlenítő medencét, ha szükséges, naponta után kell tölteni **VIREX 1% vagy PERFECT KOMBICID 1%-os** töménységű fertőtlenítőszeres oldattal, hetente ellenőrizni kell, és ki kell takarítani, ha nagyon szennyezett. A medencén való áthajtás után kell a magasnyomású berendezéssel a fertőtlenítést elvégezni.

5.4. A gépkocsik fertőtlenítése: A telepre behajtó gépkocsik fertőtlenítését magasnyomású permetező berendezéssel kell elvégeztetni, **PERFECT KOMBICID 1%-os** fertőtlenítőszeres oldattal. A fertőtlenítést a telepvezető által megbízott személy vagy a telepvezető köteles elvégezni. A permetező berendezést és a vezetékeket úgy kell tárolni, hogy a fertőtlenítést hideg időjárás esetén is elvégezhessek. Fagyos időjárás esetén olyan helyen kell tárolni a fertőtlenítő berendezést, hogy az bármikor alkalmas legyen fertőtlenítésre, pl. fűtött tároló hely. Amennyiben az időjárási viszonyok a kerékfertőtlenítő üzemeltetését vagy a magasnyomású permetező berendezés használatát nem teszik lehetővé, a telepre behajtó gépjárművek kerekeit locsoló kannával **PERFECT KOMBICID 1%-os** oldattal kell lefertőtleníteni.

5.5. A baromfitelepre behajthatnak külön állatorvosi engedély nélkül az engedélyezett rendszámú takarmányos járművek, engedélyezett rendszámú napi göngyöleg- és konténer-szállítást végző járművek. Minden más jármű beengedése előtt szóban értesíteni kell az állatorvost az engedélyeztetés céljából. A behajtó járművekről nyilvántartást kell vezetni. A termelési vezető szervezése és engedélyezése szerint a telepekre behajthatnak fertőtlenítés után az állat (vágó, vagy tenyész), az alomszalma, a faforgács, a mézsgritt, a csibekavics és a zsákos takarmányt szállító járművek. A telepvezető szervezése és a termelési vezető engedélye alapján behajthat a telepet kaszáló gép. Egyéb járművek (karbantartási munkáknál, stb.) csak az üzemelést irányítók és az állatorvos külön engedélyével hajthatnak be.

A gépkocsik csak tiszta, fertőtlenített állapotban engedhetők a telep területére, a helyben igényelt szállító járművek tisztaságát és a fertőtlenítést a rakodás előtt kell ellenőrizni. A járművek tisztaságát a telepvezető köteles ellenőrizni szemrevételezéssel.

Piszkos, trágyával szennyezett járműveket a telepvezető nem engedhet be!

A telepvezető távollétében az általa megbízott személy felelős a jármű tisztaságának ellenőrzéséért. A járművek (pl. karbantartási munkáknál) mosását és fertőtlenítését a termelési vezető és a telepvezető köteles megszervezni, majd az állatorvost is kötelesek tájékoztatni. Állatszállítások esetén az állatorvos is köteles ellenőrizni a járművek tisztaságát.

5.6. Az alomanyag szállítása: Minden szállítás előtt kötelező a járművek tisztítása és fertőtlenítése. A szállító jármű tisztaságát a telepvezető köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. Az alom szállítása esetén a rakodó munkások azon a telepen kötelesek munkaruhába átöltözni, ahol az alomanyagra szükség van. A dolgozók toborzását a telepvezető végzi és ellenőrzi. A

rakodó munkások alkalmazása során ugyanazokat a higiéniai és járványvédelmi szabályokat kell alkalmazni, mint a saját dolgozóknál. A telepre való belépéskor minden alkalommal kötelező a fürdés és a telepi munkaruha használata. A rakodó munkásoknak a telepvezető köteles biztosítani a fürdéshez szükséges dolgokat (törölköző, papucs, sampon), valamint a külön telepi munkaruhát és a gumicsizmát vagy lábzsákot.

6. Anyagforgalom

6.1. Ellenőrzés: A telepvezető köteles ellenőrizni a telephez érkező jármű rakterét, ha ott trágyával, porral szennyezett, potenciálisan fertőzést terjesztő anyagokat vagy eszközöket talál, a jármű lerakódását nem engedélyeztetheti, a szállított anyagot nem engedheti be a telepre.

6.2. Fertőtlenítés: A technológiai berendezéseket a szállítás előtt tisztítani és fertőtleníteni (**PERFECT KOMBICID 1%-os** hígításban oldatos lemosás) kell, amikor azokat egy másik telepre akarják átszállítani. Csak elmosott, tiszta és fertőtlenített használt technológiai berendezések szállíthatók.

Az állomány bennállása alatt a telepre érkező üzemeléshez szükséges etető és itató alkatrészeket a telep kapuja előtt le kell rakodni, és csak a telep kapujában elvégzett **PERFECT KOMBICID 1%-os** fertőtlenítés után szállíthatók be a telepre. Szükség esetén használható a **PERFECT KOMBICID 1%-os** fertőtlenítőszerrel feltöltött tiszta áthajtó medence az anyagok áztatásos fertőtlenítésére.

7. Istállózárság

7.1. Az istállók ajtóit folyamatosan zárva kell tartani, azt csak a belépés esetén lehet kinyitni. Az ajtókat akkor is zárni kell, ha azok az istállókat összekötő folyosóra nyílnak.

7.2. A vadmadarak berepülésének megelőzése: A napi telep bejáráskor ellenőrizni kell a légbeejtő nyílásokon, ablakokon és ventilátorokon elhelyezett madárhálót, árnyékolókat és sérülés, szakadás esetén azokat azonnal javítani kell. Az ellenőrzés a telepvezető feladata. Az istállók külső faláról, a kályhás helyiségekből, a szalmatárolókból a vadmadár fészkeket a tavaszi nyári időszakban, időben és rendszeresen el kell távolítani, hogy a fészkelés megakadályozható legyen.

8. Járványvédelem

8.1. Az istállóba történő belépéskor a lábbeli- és kézfertőtlenítő használata kötelező. Kézfertőtlenítés céljából a bejáratnál a bejárat mellett kézfertőtlenítő lavort, fertőtlenítőszer adagolót, lábbeli fertőtlenítés céljára belépő tálcát kell elhelyezni. Kézfertőtlenítés 4.3. szerint.

A belépő fertőtlenítőszeres tálcába **VIREX 1%-os** oldatot kell tölteni, (színváltozással jelzi a fertőtlenítő oldat hatékonyságának csökkenését) annyit, hogy a belépésnél a csizmaszár legalább boka magasságig fertőtleníteni lehessen. Cserélni naponta szükséges, gyakrabban akkor, ha az oldat elhasználódott (pl. szállítás) telepvezető ellenőrzi.

8.2. A gumicsizma használat szabályai különálló istállók esetén: Külső (FEKETE) gumicsizma használandó a szociális helyiségtől az istálló előtérig, belső (FEHÉR) gumicsizma használandó az istállóba (állatok közé)

való belépéskor. Az istálló előtér ajtaja mellé egy belépő lábbeli fertőtlenítőt kell elhelyezni, ennek használata minden egyes belépésnél kötelező.

Belépésnél a fertőtlenítőszeres oldatnak a lábfejet is el kell fednie. Feltöltésére **VIREX 1%-os** oldatot kell használni, amit naponta cserélni kell. Az előtérben való járás és munkavégzés során használható a fekete gumicsizma.

Az istállók belső terébe (állatok közé) való belépés előtt kell gumicsizmát cserélni. Célszerű a belső ajtó közelében ülő alkalmatosságot elhelyezni, amire ülve elvégezhető a lábbeli csere, a FEHÉR gumicsizma felvétele.

8.3. Az előterek, és a folyosó padozatát naponta egyszer fel kell söpörni, és fel kell mosni **PERFECT KOMBICID 1,5%-os** fertőtlenítő oldattal.

9. Rovar- és kártevő irtás (Szakvizsgával rendelkező gázmester végezheti !)

9.1. Rovarirtás: Az állomány elszállítása után az alom feletti félméteres sávban az oldalfalat és tartóoszlopokat rovar irtószerrel sávpermetezéssel vagy ködösítéssel kezelni kell, hogy az **alombogár** ne tudjon az oldalfalon és az álmennyezeten lévő repedésekbe elbújni.

A feladatot közvetlenül a kiürítés után kell elvégezni, ne hagyjuk kihűlni az ólat. Amennyiben nem történt meg kiürítéskor az alombogarak irtása az ólban **rovarirtó szer** oldattal kell a bogarak búvóhelyét kezelni, célzott sávpermetezéssel (légbeejtők, ventilátorok, kapcsolók, repedések, oldalfal-mennyezet, oldalfal-padló, tartóoszlopok-mennyezet, csatorna nyílások, ajtók, ablakok), vagy ködösítéssel.

Erre a célra javasolt porozó szerekkel is végezhető az alombogár irtása. Amennyiben az ólakban meszelés történik az alombogár irtás a meszelés után kell, hogy történjen.

A legyek irtását szezonálisan, már az első legyek megjelenésétől kezdve az engedélyezett légyirtó szerek használati utasítása szerint folyamatosan kell végezni.

9.2. Kártevők irtása: A telep higiénája – ennek keretén belül a kártevők elszaporodásának megelőzése érdekében a telep egész területét az épületekkel együtt tisztán kell tartani, a takarmányhulladékot és a trágyamaradványokat rendszeresen el kell takarítani, a takarmányt jól zárt tartályokban kell tárolni. Az állati hullákat rendszeresen, naponta többször össze kell gyűjteni és haladéktalanul zárt tárolóban kell elhelyezni.

Az eredményes rágcsálóirtás feltételei:

- fel kell deríteni a rágcsálók búvólyukait, különösen a padozat és a mennyezet hézagait
- a búvólyukakat és a hézagokat az eredményesnek mutató rágcsálóirtás után ki kell javítani, el kell távolítani minden szemetet és takarmány hulladékot ami a rágcsálóknak búvóhelyül, eleségül szolgálhat
- a méreggel történő rágcsálóirtást mindenkor az alkalmazott méreg használati utasításának megfelelően kell végezni
- a méregládák elhelyezéséről térképet kell készíteni
- a méregládákat hetente ellenőrizni szükséges és az esetleges fogyást feljegyezni és pótolni kell,- a telepvezető feladata

Szakvizsga hiányában a tulajdonos csak szabadforgalmú irtószereket használhat.

A kártevők ellen alkalmazott mérgeket erre a célra kijelölt, tökéletesen zárható, száraz, hűvös raktárhelyiségben kell tartani. A helyiség padozata vizet át nem eresztő, sima felületű legyen, az itt használt eszközöket és göngyölegzet feltűnő módon meg kell jelölni.

A mérgeket sérült göngyölegben tárolni tilos.

A kártevők irtására felhasznált szerekről, a kártevőirtás időpontjáról nyilvántartást kell vezetni.

10. Takarmányozás

10.1. A baromfitelepre a takarmányt gépjárművek szállítják.

10.2. A gépjármű a kötelező kerékfertőtlenítés után a telepen levő zárt takarmánysilókba deponálja a tápot, ahonnan spirális behordó juttatja be az épületekbe.

10.3. A takarmány megrendelését úgy kell szervezni, hogy a szállító járműben levő táp elférjen a silókba. A takarmány egyéb módon való tárolása (zsák, kamra, raktár stb.) - kivételt képez a kifejezetten zsákos árut fogadó telepet - tilos. Minden szállítmányból takarmánymintát kell venni, amit a telepen hűvös, jól szellőző, zárt raktárban kell három hónapig megőrizni.

A gépkocsivezetőnek a telep kapujánál fóliacsizmát és egyszer használatos védő ruhát kell adni, amit fel kell vegyen.

10.4. Az istállókban rendszeresen ellenőrizni kell az etető berendezések műszaki állapotát és az esetleges takarmányszóródást, okozó hibát meg kell szüntetni.

10.5. A silótetőket zárva kell tartani. Az esetlegesen kiszóródott takarmányt azonnal el kell takarítani, és a szeméttárolóba rakatni. A takarmány tároló silók levegőztető nyílását zsákkal kell burkolni a kifújódó takarmány por összegyűjtése céljából.

10.6. A silótartályokat turnusonként teljesen le kell üríteni, és ki kell tisztítani. A silókból ilyen módon kitakarított takarmányozásra alkalmatlan hulladékot a szeméttárolóba kell elhelyezni.

A silókat takarítás után **FUMAGRI** füstképző patron használati utasítása szerint fertőtleníteni kell. 15 óra behatási idő. Telepvezető végzi és a fertőtlenítési naplóba bejegyzi.

11. Egyéb állatok tartásának szabályai

A kutyákat, juhokat, kecskéket stb. a telep területén **nem szabad tartani.**

12. Állatforgalom szabályai

12.1. Állat beszállítás a telepre: A termelési vezető a tervezett szállításról köteles tájékoztatni az ellátó állatorvost. A szállításról Állatorvosi igazolást kell kiállítani. A szállítás előtt a telepvezető és az állatorvos szemrevételezéssel köteles ellenőrizni a járművek tisztaságát és fertőtlenítési igazolásokat. A belépő gépjárművek fertőtlenítésekor az 5.3. és 5.4. pontok szerint kell eljárni.

12.2. Vágás a termelési időszak végén: A termelési időszak végén a szállító járművek tisztaságát és fertőtlenítési igazolásait a telepvezető és az állatorvos szemrevételezéssel köteles ellenőrizni. A telepre való beengedés előtt a gépjárműveket fertőtleníteni kell az 5.3. és 5.4 pontok szerint.

12.3. Szállítási útvonal: A szállítás útvonalát előre meg kell tervezni úgy, hogy az a lehető legkevesebb állategészségügyi kockázattal járjon. A szállítás útvonalát a termelési vezető határozza meg az állatorvossal egyetértésben.

13. Egyéb

13.1. A telepeken a kommunális szennyvíz szippantását igény szerint el kell végeztetni. Az elszállítását követően az esetleges elfolyásból, csepegésből adódó szennyeződést fel kell takarítani és az akna környezetét **PERFECT KOMBICID 1% - os** oldattal fertőtleníteni kell.

13.2. Az istállók közötti területen hulladékot / farostlemezt, kerítő stb. / tárolni TILOS, azt az állományváltási időszak végén, még a fertőtlenítések megkezdése előtt meg kell semmisíteni vagy el kell szállíttatni.

13.3. A telepen képződő kommunális hulladékot a telep előtt elhelyezett konténerben kell gyűjteni és ezt rendszeresen el kell szállíttatni. Minden telepen kötelező kommunális hulladék gyűjtő konténer telepítése.

13.4. A telep területét rendszeresen kaszálni kell.

14. Állategészségügyi szabályok

14.1. Szalmonellózis felderítésére szolgáló vizsgálatok

A mintavételeket ellátó állatorvos végzi és kísérő iratot állít ki a laboratóriumi vizsgálathoz.

1. minta: Fertőtlenítés eredményességének tamponos vizsgálata (3.3. szerint)

2. minta: Meconium minta (5 db csibeszállító dobozból) + naposcsibe hullák (min, 10 db. max. 60 db)

3. minta: A taposó bélsárminta vágás előtt három héttel (két pár taposó csizmatampon minta/ól) vétele esetén az istállóban használt gumicsizmára kell húzni a hálót. Közvetlenül utána a mélyalomban az istálló teljes hosszában egyszer oda-vissza végig kell gyalogolni.

A mintavétel után a hálót a polietilén zacskóba kell helyezni. A belépő lábbeli fertőtlenítőt a háló csizmatalpra való felerősítése után tilos használni.

4. minta: Kiszállítás utáni tamponos vizsgálat

A mintavétel után azonnal össze kell gyűjteni az istállóban vett mintákat, és tiszta helyen kell tárolni a beszállításig (egy nagyobb polietilén zacskóba zárva). Minden gyűjtő zacskóra rá kell írni a telep nevét, dátumot és az istálló számát.

A minták vizsgálatát akkreditált és kijelölt laboratórium végezheti!

14.2. Selejt állatokkal való bánásmód: Selejtnek minősülnek a mozgásképtelen, elfekvő vagy sérült beteg állatok. Ezeket az állatokat a selejt fülkében kell összegyűjteni. Kiirtásukat, az állatorvos engedélyezi és ellenőrzi, baromfi kiirtására engedélyezett módszerrel, vértelen úton lehet megoldani.

14.3. Megbetegedés, elhullás bejelentése: A telepvezető köteles azonnal értesíteni az állatorvost, ha az állományban rendellenes elváltozásokat vagy tüneteket észlel, vagy ha az elhullás megemelkedik.

15. Állati eredetű melléktermékek kezelése

15.1. Hullagyűjtés naponta kötelező. A hullagyűjtés után kezet kell mosni, majd **ZAZU** fertőtlenítő gél kell használni. A hullagyűjtés után a szennyeződött felületeket **PERFECT KOMBICID 1,5%-os** oldattal

fertőtleníteni kell. A fertőtleníító oldat elkészítését, a fertőtleníítés ellenőrzését a telepvezető végzi.

15.2. Hullatárolás: Az elhullott állatok gyűjtése a nevelő épületek előterében elhelyezett műanyag gyűjtőzacskóban történjen, majd ezeket légmentesen lezárva a kerítés vonalában elhelyezett műanyag hullatárolókba helyezték el. Az állati hulladék megsemmisítésére, szerződött céggel kell elszállítatni.

A hullatárolót ürítés után tisztítani és **PERFECT KOMBICID 1,5%-os** oldattal fertőtleníteni szükséges. A szállítójármű nem léphet be a telepre ennek ellenére a kihordási útvonalat és a kívül lévő jármű kerekeit minden esetben fertőtleníteni szükséges.

15.3. A kórbonctani vizsgálatra előkészített hullákat a boncoló helyiségbe kell szállítani. A boncolás után a hullákat azonnal a műanyag hullatárolóba kell elhelyezni. A boncoló teljes belső mosható felületét le kell mosni, majd **vagy PERFECT KOMBICID 1,5%-os** oldattal fertőtleníteni kell.

15.4. Nyilvántartás: A telepvezető napi nyilvántartást vezet a megsemmisített hulla mennyiségről és a keletkezett hulladékról.

16. Állatgyógyászati készítmények alkalmazásának szabályai

16.1. Rendelés: A vakcinák, gyógyszerek rendelése az ellátó állatorvos feladata. A fertőtleníítőszer és a nem vényköteles készítmények (vitaminok, takarmány kiegészítők) beszerzését a telepvezető végzi.

16.2. Tárolás: A telepeken csak a felhasználás céljából kiszállított készítményeket tárolják. A vakcinákat mindig hűtőszekrényben kell tárolni a telepeken.

16.3. Gyógykezelések rendje: Gyógyszer és vitamin itatás során a törzsoldat elkészítését és a gyógyszer kimérését a kiadott írásos *Gyógykezelési utasítás* szerint csak a telepvezető végezheti el.

A törzsoldat készítéséhez használt vödörket, edényeket minden nap a törzsoldat elkészítése előtt ki kell mosatni, majd tiszta vízzel ki kell öblíttetni.

16.4. Veszélyes hulladék: A kezelések során felhasznált antibiotikumok csomagolóanyaga, a fertőtlenítőszeres göngyölege, vakcinás ampullák és üvegek veszélyes hulladéknak számítanak, azokat az erre kijelölt helyen kell az elszállításig gyűjteni, megőrizni. Megsemmisítésre való elszállítás fél évente egyszer történik.

16.5. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: A gyógykezelési utasításokon az állatorvos által meghatározott élelmezés egészségügyi várakozási időn belül, vágás céljából, a telepről állatokat tilos elszállítani.

16.6. Nyilvántartás: A gyógykezelési utasításokat a telepen 3 évig meg kell őrizni. Telepen külön gyógyszer felhasználási nyilvántartást vezetnek (bevétel, felhasználás).

17. Az állattartó telepen szükséges dokumentációk

- Számítógépes telepi nyilvántartás (4. oldal)
- Fertőtlenítési napló (7. oldal)
- Látogatási napló (15. oldal)
- Gépjármű nyilvántartási napló (16. oldal)

- Trágya nyilvántartási napló (4. oldal)
- Oktatási napló (17. oldal)
- Rágcsáló irtási napló (24. oldal)
- Állati hulladék nyilvántartási napló (28. oldal)
- Boncolási napló (28. oldal)
- Gyógykezelési utasítás (29. oldal)

Felelősök

1. **Állatjóléti felelős:** Az állatjóléti felelős feladata, hogy felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartását, ellássa az állatok gondozásával, felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással, évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM-rendelet szerint, minden nagy létszámú hústermelés céljából tartott csirketartónak állatjóléti felelőst kell kijelölnie. Azt a személyt lehet állatjóléti felelősnek kijelölni, aki a kijelölést megelőzően állatvédelmi képzésen vett részt, és képesítési bizonyítványt szerzett. A képesítési bizonyítványt megszerző személy valamennyi állattartó telepen végezhet állatjóléti felelősi tevékenységet, állatfajtól és állatlétszámtól függetlenül.

2. A higiéniai és járványvédelmi program szabályainak betartásáért és betartatásáért a telepvezető felelős.

3. A higiéniai és járványvédelmi utasítás tartalmát az állatorvos a telepen a dolgozókkal oktatás formájában ismerteti. Az oktatás igazolása céljából az utolsó oldalon minden dolgozó aláírása szükséges.

Dátum:

.....

ellátó állatorvos

.....

telepvezető